

ชื่อ.....สกุล.....ตำแหน่ง.....

ข้อสอบ Pre-test , Post-test

ส่วนที่ 1 จงทำเครื่องหมาย X ในข้อที่ถูกต้อง

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ไม่ถูกต้อง
 - ก. ตัวท่อนไม้ซาง มีขนาดเหมาะสมกับลูกดอก ผิวด้านในมันเรียบ ไม่มีตะเข็บ
 - ข. การเป่าเป็นการบีบกล้ามเนื้อกระพุ้งแก้มร่วมกับลมจากปอด จะแรงและแม่นยำ
 - ค. ส่วนเข็มเป่ายาให้มีขนาดพอเหมาะ เบอร์ 18 หรือเบอร์ 22
 - ง. บรรจุลูกดอกลงในไม้ซางให้ลึกลงในด้านเป่า ประมาณ 5 ซม.เพื่อให้เกิดช่องความดัน
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ไม่ใช่อุปกรณ์การจับบังคับสัตว์
 - ก. ไม้ซาง
 - ข. สวิง
 - ค. ถุงมือหนัง
 - ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
3. หลักในการจับบังคับสัตว์คือข้อใด
 - ก. คนปลอดภัย สัตว์ปลอดภัย ทำงานสำเร็จ
 - ข. สัตว์สงบ ทำงานง่าย
 - ค. งานสำเร็จ ประหยัดงบ
 - ง. ยาแรง คนแมน สัตว์ปลอดภัย
4. ประเภทของการจับบังคับสัตว์ คือข้อใด
 - ก. Physical restrain
 - ข. Chemical restrain
 - ค. ถูกทั้ง ก และ ข
 - ง. ไม่มีข้อใดถูก
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้ออุปกรณ์ในการจับบังคับสัตว์ทางกายภาพ
 - ก. ไม้ซาง
 - ข. ตาข่าย
 - ค. ลูกดอก
 - ง. ปืนยิงยาสลบ
6. ข้อใดไม่ใช่ยากล่อมประสาท
 - ก. Xylazine HCL
 - ข. Acepromazine maleate
 - ค. Atropine sulfate
 - ง. Diazepam

ชื่อ.....สกุล.....ตำแหน่ง.....

7. ยา Amtidote (ยาด้านฤทธิ์) ของ Xylazine HCL คือข้อใด
 - ก. Acepromazine maleate
 - ข. Atropine sulphate
 - ค. Yohimbine HCL.
 - ง. Babiturates
8. ตำแหน่งที่เหมาะสมในการยิงยาสลบสุนัขคือข้อใด
 - ก. หัว
 - ข. ขาหลัง
 - ค. ช่องท้อง
 - ง. ขาหน้า
9. ข้อจำกัดเพื่อให้การจับบังคับสัตว์ด้วยการใช้ Chemical มีประสิทธิภาพ คือข้อใด
 - ก. ต้องกระทำในพื้นที่เงียบ
 - ข. ต้องกระทำในพื้นที่อากาศโปร่ง
 - ค. ต้องกระทำในขณะที่สัตว์นั่งหรือนอน
 - ง. ต้องกระทำในพื้นที่ไม่มีลม
10. เมื่อสัตว์สลบแล้วสิ่งใดที่ไม่จำเป็นต้องทำ
 - ก. ตรวจสอบการหายใจสัตว์
 - ข. รมัดระวางตัว
 - ค. เตรียม Antidote
 - ง. ไม่มีข้อใดถูก

ส่วนที่ 2 นำตัวอักษรภาษาอังกฤษด้านขวามือไปใส่ในหน้าข้อที่คิดว่ามีความสัมพันธ์กันมากที่สุด

.....1. Zoletil®	A. 10-15 เมตร
.....2. มีผลข้างเคียงทำให้สัตว์อาเจียน	B. ทำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้งาน
.....3. ลูกดอกยิงยาสลบ	C. ลดการหลังของน้ำลาย
.....4. phenobarbital	D. Zolazepam+Tiletamine
.....5. มีผลข้างเคียงให้ความดันโลหิตต่ำลง	E. Acepromazine maleate
.....6. ระยะในการเป่าลูกดอกยาสลบ	F. ขนาดตามน้ำหนักตัว แต่ไม่ควรเกิน 2 CC
.....7. Atropine Sulfate	G. เต็มชัดเจนเห็นง่าย
.....8. Adrenaline	H. Xylazine HCL
.....9. สีฟู่ปลายลูกดอก	I. กระตุ้นการเต้นของหัวใจ
.....10. Xylazine HCL	J. Nembutal®