

แบบประเมินความรู้ ก่อนอบรม หลังอบรม

A	B
..... ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ =0	1. Hellabrunn's mixture
..... ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ =2	2. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
..... ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ >2	3. ไกลหัวใจ ไกลเส้นเลือด ไกลสมอง
..... Xylazine HCl + KetamineHCl	4. 10-14mg/lbs bw.(22-30 mg/kgbw.)
..... XylazineHCl+KetamineHCl+Acp maleate	5. ใช้ในช้างได้ดี (ยาซึมในช้างตมมัน)
..... Pentobarbital sodium(Nembutal/Sagatal)	6. สุนัขที่กินอาหารแล้วอาเจียน
..... ในการฉีดยาสลบเข้ากล้ามเนื้อด้วยมือ หรือ ใช้ลูกคอกยิงยา	7. ปกติ
..... สัตว์ช็อคยาสลบ	8. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
..... Acepromazine maleate(Acp maleate)	9. Yohimbine HCl.
..... Xylazine HCl.	10. ด้านฤทธิ์กัน
..... Ketamine HCl.	11. ATP./ E/Selenium.
..... Doxapram HCl.	12. Atipamizal.
..... Medetomidine.+Azaperone	13. เสริมฤทธิ์กัน
..... Capture myopathy.	14. Antidote.
..... Zoletil.	15. Acidosis.
..... Fentanyl/Kafentanyl citrate	16. พบเสมอเมื่อเครียด ตายแบบเฉียบพลันในกวางเลี้ยง สัตว์ป่า
..... Promethazine ,chlorpromazine,acepromazine	17. ในแมว เลือ จะดึงMg.ขับทิ้งทางไต แมวหรือเสือชกกระตุกจนเสียชีวิต
..... Perphenazine enanthate.	18. อนุพันธ์ ของมอร์ฟีน
..... Yohimbine HCl.	19. อนุพันธ์ของไดอะซีแพมและคีตามีน
ชื่อ-สกุล.....	20. ออกฤทธิ์เร็ว และมีระยะสลบนานในสุนัขที่เครียด และในสภาพอากาศร้อนจัด สุนัขอาจตายได้
ตำแหน่ง.....สังกัด.....	21. กรณีฉุกเฉินใช้เป็นAntidote.ยากลุ่ม Barbiturate ได้
อำเภอ.....จังหวัด.....	22. อนุพันธ์ในกลุ่ม Phenothiazine.
คะแนน Pre test.....	23. สำหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ออกฤทธิ์นาน
Post test.....	24. i/m induce infarction.
	25. ในช้าง0.02-0.04 mg/kg.จนถึงขนาด 0.08mg/kg.ถ้าเกินไปถึง 0.15mg/kg. dead 100%
	26. ใช้กินในแมวสลบได้

A	B
.....10..... ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ =0	1. Hellbrunn's mixture
.....7..... ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ =2	2. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
.....13..... ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ >2	3. ไกลหัวใจ ไกลเส้นเลือด ไกลสมอง
.....4..... Xylazine HCl + KetamineHCl 0	4. 10-14mg/lbs bw.(22-30 mg/kgbw.)
.....13..... XylazineHCl+KetamineHCl+Acp maleate	5. ใช้ในช้างได้ดี (ยาซึมในช้างตมกัม)
.....2..... Pentobarbital sodium(Nembutal/Sagatal) 0.5	6. สุนัขที่กินอาหารแล้วอาเจียน
.....3..... ในการฉีดยาสลบเข้ากล้ามเนื้อด้วยมือ หรือ ใช้ลูกดอกยิงยา	7. ปกติ
.....11..... สัตว์หรือคนสลบ 0	8. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
.....16..... Acepromazine maleate(Acp maleate) 0	9. Yohimbine HCl.
.....6..... Xylazine HCl. 0	10. ต้านฤทธิ์กัน
.....8..... Ketamine HCl. 0	11. ATP/ E/Selenium.
.....9..... Doxapram HCl. 0	12. Atipamizal.
.....5..... Medetomidine.+Azaperone *0	13. เสริมฤทธิ์กัน
.....16..... Capture myopathy. 0-3	14. Antidote.
.....19..... Zoletil.	15. Acidosis.
.....16..... Fentanyl/Kafentanyl citrate 0.5	16. พบเสมอเมื่อเครียด ตายแบบเฉียบพลันในกวางเลี้ยง สัตว์ป่า
.....22..... Promethazine ,chlorpromazine,acepromazine	17. ในแมว เลือ จะดึงMg.ขับทิ้งทางไต แมวหรือเสือชกกระดูกจนเสียชีวิต
.....5..... Perphenazine enanthate.	18. อนุพันธ์ุของมอร์ฟีน
.....14..... Yohimbine HCl.	19. อนุพันธ์ุของไดอะซีแพมและคีตามีน
ชื่อ-สกุล..... น.ศ. อธิวัฒน์ พลพ	20. ออกฤทธิ์เร็ว และมีระยะเวลาในสุนัขที่เครียด และในสภาพอากาศร้อนจัด สุนัขอาจตายได้
ตำแหน่ง..... หมอส่วนหน้า ปศุสัตว์ สังกัด..... สบ.ปศอ. ชส	21. กรณีฉุกเฉินใช้เป็นAntidote.ยากลุ่ม Barbiturate ได้
อำเภอ..... จังหวัด.....	22. อนุพันธ์ุในกลุ่ม Phenothiazine.
คะแนน Pre test..... 10.7	23. สำหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ออกฤทธิ์นาน
Post test.....	24. i/m induce infarction.
	25. ในช้าง0.02-0.04 mg/kg.จนถึงขนาด 0.08mg/kg.ถ้าเกินไปถึง 0.15mg/kg. dead 100%
	26. ใช้กินในแมวสลบได้

แบบประเมินความรู้ ก่อนอบรม หลังอบรม

A	B
..... 10..... ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ =0	1. Hellabrunn's mixture
..... 7..... ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ =2	2. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
..... 13..... ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ >2	3. ไกลหัวใจ ไกลเส้นเลือด ไกลสมอง
..... 13, 1..... Xylazine HCl + KetamineHCl	4. 10-14mg/lbs bw.(22-30 mg/kgbw.)
..... 13..... XylazineHCl+KetamineHCl+Acp maleate	5. ใช้ในช้างได้ดี (ยาซึมในช้างตกมัน)
..... 2, 4..... Pentobarbital sodium(Nembutal/Sagatal)	6. สุนัขที่กินอาหารแล้วอาเจียน
..... 3..... ในการฉีดยาสลบเข้ากล้ามเนื้อด้วยมือ หรือ ใช้ลูกคอกยงยา	7. ปกติ
..... 9..... สัตว์หรือคอกยงยา	8. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
..... 22..... Acepromazine maleate(Acp maleate)	9. Yohimbine HCl.
..... 1..... Xylazine HCl.	10. ด้านฤทธิ์กัน
..... 1..... Ketamine HCl.	11. ATP./ E/Selenium.
..... 21..... Doxapram HCl.	12. Atipimizal.
..... 12, 13..... Medetomidine.+Azaperone *	13. เสริมฤทธิ์กัน
..... 15, 11, 16..... Capture myopathy.	14. Antidote.
..... 13, 19..... Zoletil.	15. Acidosis.
..... 17, 18..... Fentanyl/Kafentanyl citrate	16. พบเสมอเมื่อเครียด ตายแบบเฉียบพลันในกวางเลี้ยง สัตว์ป่า
..... 22..... Promethazine ,chlorpromazine,acepromazine	17. ในแมว เสื่อ จะดึงMg.จับทิ้งทางไต แมวหรือเสื่อชักกระตุกจนเสียชีวิต
..... 5..... Perphenazine enanthate.	18. อนุพันธ์ ของมอร์ฟีน
..... 14..... Yohimbine HCl.	19. อนุพันธ์ของไดอะซีแพมและคีตามีน
ชื่อ-สกุล..... สิบเจา ดิลิปปะลา	20. ออกฤทธิ์เร็ว และมีระยะสลบนานในสุนัขที่เครียด และในสภาพอากาศร้อนจัด สุนัขอาจตายได้
ตำแหน่ง..... กองสัตวแพทย์..... สังกัด..... สบ.ปศ.ว.จร.	21. กรณีฉุกเฉินใช้เป็นAntidote.ยากลุ่ม Barbiturate ได้
อำเภอ..... ไล่อ..... จังหวัด..... อ.ระยอง	22. อนุพันธ์ในกลุ่ม Phenothiazine.
คะแนน Pre test.....	23. สำหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ออกฤทธิ์นาน
Post test..... 19 000 0	24. i/m induce infarction.
	25. ในช้าง 0.02-0.04 mg/kg.จนถึงขนาด 0.08mg/kg.ถ้าเกินไปถึง 0.15mg/kg. dead 100%
	26. ใช้กินในแมวสลบได้

แบบประเมินความรู้ ก่อนอบรม หลังอบรม

A	B
10 ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ =0	1. Hellabrunn's mixture
7 ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ =2	2. ซีดเข้าหลอดเลือดดำ
13 ยาขนานที่1+ยาขนานที่2 ออกฤทธิ์ >2	3. ไกลหัวใจ ไกลเส้นเลือด ไกลสมอง
1 Xylazine HCl + KetamineHCl	4. 10-14mg/lbs bw.(22-30 mg/kgbw.)
13 XylazineHCl+KetamineHCl+Acp maleate	5. ใช้ในช้างได้ดี (ยาซึมในช้างตกมัน)
2/4 Pentobarbital sodium(Nembutal/Sagatal)	6. สุนัขที่กินอาหารแล้วอาเจียน
3 ในการฉีดยาสลบเข้ากล้ามเนื้อด้วยมือ หรือ ใช้ลูกคอกยิงยา	7. ปกติ
9 สัตว์ช็อคยาสลบ	8. ซีดเข้ากล้ามเนื้อ
22 Acepromazine maleate(Acp maleate)	9. Yohimbine HCl.
1 Xylazine HCl.	10. ต้านฤทธิ์กัน
1 Ketamine HCl.	11. ATP./ E/Selenium.
21 Doxapram HCl.	12. Atipamizal.
13, 12 Medetomidine.+Azaperone *	13. เสริมฤทธิ์กัน
11, 15 Capture myopathy.	14. Antidote.
19, 19 Zoletil.	15. Acidosis.
17 Fentanyl/Kafentanyl citrate 0.5	16. พบเสมอเมื่อเครียด ตายแบบเฉียบพลันในกวางเลี้ยง สัตว์ป่า
22 Promethazine ,chlorpromazine,acepromazine	17. ในแมว เสื่อ จะดึงMg.ขับทิ้งทางไต แมวหรือเสื่อชักกระตุกจนเสียชีวิต
5 Perphenazine enanthate.	18. อนุพันธ์ ของมอร์ฟีน
14 Yohimbine HCl.	19. อนุพันธ์ของไดอะซีแพมและคีตามีน
ชื่อ-สกุล..... นร.ลา อ.สุรินทร์ อ.มอญชัย	20. ออกฤทธิ์เร็ว และมีระยะเวลาสั้นในสุนัขที่เครียด และในสภาพอากาศร้อนจัด สุนัขอาจตายได้
ตำแหน่ง..... ภาควิชาแพศยาสัตวแพทย์ สังกัด..... สัตวแพทย์ ม.ขอนแก่น	21. กรณีฉุกเฉินใช้เป็นAntidote.ยากลุ่ม Barbiturate ได้
อำเภอ..... เมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	22. อนุพันธ์ในกลุ่ม Phenothiazine.
คะแนน Pre test.....	23. สำหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ออกฤทธิ์นาน
Post test..... 185	24. i/m induce infarction.
	25. ในช้าง0.02-0.04 mg/kg.จนถึงขนาด 0.08mg/kg.ถ้าเกินไปถึง 0.15mg/kg. dead 100%
	26. ใช้กินในแมวสลบได้

A	B
10..... ยาชานานที่1+ยาชานานที่2 ออกฤทธิ์ =0 1	1. Hellabrunn's mixture
1..... ยาชานานที่1+ยาชานานที่2 ออกฤทธิ์ =2 0	2. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
13..... ยาชานานที่1+ยาชานานที่2 ออกฤทธิ์ >2 1	3. ไกลหัวใจ ไกลเส้นเลือด ไกลสมอง
8..... Xylazine HCl + KetamineHCl 0	4. 10-14mg/lbs bw.(22-30 mg/kgbw.)
4..... XylazineHCl+KetamineHCl+Acp maleate 0	5. ใช้ในช้างได้ดี (ยาซึมในช้างตกมัน)
2..... Pentobarbital sodium(Nembutal/Sagatal) 0.5	6. สุนัขที่กินอาหารแล้วอาเจียน
3..... ในการฉีดยาสลบเข้ากล้ามเนื้อด้วยมือ หรือ ให้ลูกคอกยิงยา	7. ปกติ
17..... สัตว์หรือคนยาสลบ 0	8. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
20..... Acepromazine maleate(Acp maleate) 0	9. Yohimbine HCl.
6..... Xylazine HCl. 1	10. ด้านฤทธิ์กัน
8..... Ketamine HCl. 1	11. <u>ATP/ E/Selenium.</u>
25..... Doxapram HCl. 0	12. Atipamizal.
15..... Medetomidine.+Azaperone, 0	13. เสริมฤทธิ์กัน
16..... Capture myopathy. 0.5	14. Antidote.
19..... Zoletil. 1	15. Acidosis.
18..... Fentanyl/Kafentanyl citrate 0.5	16. พบเสมอเมื่อเครียด ตายแบบเฉียบพลันในกวางเลี้ยง สัตว์ป่า
22..... Promethazine ,chlorpromazine,acepromazine 1	17. ในแมว เสือ จะดึงMg. ขับทิ้งทางไต แมวหรือเสือชักกระตุกจนเสียชีวิต
5..... Perphenazine enanthate, 3ml, 1	18. อนุพันธ์ ของมอร์ฟีน
21..... Yohimbine HCl. 0	19. อนุพันธ์ของไดอะซีแพมและคีตามีน
ชื่อ-สกุล..... นางสาวภัทรวรรณ ธรรมเกษียร	20. ออกฤทธิ์เร็ว และมีระยะเวลาสั้นในสุนัขที่เครียด และในสภาพอากาศร้อนจัด สุนัขอาจตายได้
ตำแหน่ง..... พมัสถวาทแพทย์ ประจำศูนย์ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	21. กรณีฉุกเฉินใช้เป็นAntidote.ยากลุ่ม Barbiturate ได้
อำเภอ..... เมืองจ. (เว้า) เพชรบูรณ์ จังหวัด..... จ. เพชรบูรณ์	22. อนุพันธ์ในกลุ่ม Phenothiazine.
คะแนน Pre test..... 9.5	23. สำหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ออกฤทธิ์นาน
Post test.....	24. i/m induce infarction.
	25. ในช้าง0.02-0.04 mg/kg.จนถึงขนาด 0.08mg/kg.ถ้าเกินไปถึง 0.15mg/kg. dead 100%
	26. ใช้กินในแมวสลบได้